

Calminex Atleta Gel

PESO LÍQ.: 20 g

Uso tópico

Cada grama de *CALMINEX® ATLETA* contém: 40 mg de salicilato de metila, 13,6 mg de extrato de beladona e 10 mg de cânfora.

Componentes inativos: bálsamo do Peru, propilenoglicol, metilparabeno, propilparabeno, carbômer, trolamina, argobase 125, chembase BHO, álcool cetosteárico, petrolato líquido, corante FDC amarelo nº 10, corante FDC azul nº1 e água. Sem o corante tartrazina.

INDICAÇÕES: *CALMINEX® ATLETA* é indicado nos processos dolorosos de articulações e massa muscular, em contusões, luxações, nevralgias, torcicolos, cãibras e traumatismos.

CONTRAINDICAÇÕES: *CALMINEX® ATLETA* é contraindicado em pacientes com hipersensibilidade aos componentes de sua fórmula.

ESTE MEDICAMENTO NÃO DEVE SER UTILIZADO EM CRIANÇAS MENORES DE 2 ANOS DE IDADE.

CALMINEX® ATLETA possui em sua fórmula ingredientes especialmente selecionados que possibilitam rápido alívio da dor provocada por torções, estiramentos, torcicolos e luxações. *CALMINEX® ATLETA* possui propriedades analgésicas e quando aplicado na área afetada, alivia a dor por um período de 6 a 12 horas.

Com sua fórmula gel, *CALMINEX® ATLETA* facilita a aplicação e penetra mais rapidamente na pele causando uma sensação refrescante e alívio imediato, por isso é indicado para praticantes de qualquer atividade física.

POSOLOGIA E MODO DE USAR: Massagear levemente com o produto o local afetado durante 1 ou 2 minutos até provocar uma leve vermelhidão (hiperemia), uma a duas vezes ao dia. Aguarde total absorção do produto. Conservar em temperatura entre 2°C e 30°C. O prazo de validade do produto encontra-se gravado nesta embalagem. Em caso de vencimento, inutilize o produto.

USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 2 ANOS DE IDADE

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS. Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas, procure orientação médica.

VENDA SEM PRESCRIÇÃO MÉDICA

MS 1.0093.0175.006-7 - Farm. Resp.: Alexandre de Abreu Villar CRF - RJ 7.472

MANTECORP IND. QUÍM. E FARM. LTDA.

Est. dos Bandeirantes, 3091- Rio de Janeiro - RJ

CNPJ: 33.060.740/0001-72 - Ind. Brasileira.

® Marca Registrada

Central de Atendimento 0800 97 99 900

Calminex H pomada

PESO LÍQ.: 20 g

Uso tópico

Cada grama de *CALMINEX® H* contém: 50 mg de salicilato de metila, 20 mg de bálsamo do Peru, 16 mg de extrato de beladona, 10 mg de cânfora e 90 mg de óxido de zinco. Componentes inativos: petrolato branco.

INDICAÇÕES: *CALMINEX® H* é indicado nos processos dolorosos de articulações e massa muscular, em contusões, luxações, nevralgias, torcicolos, câibras e traumatismos musculoesqueléticos.

CONTRAINDICAÇÕES: *CALMINEX® H* é contraindicado em pacientes com hipersensibilidade aos componentes de sua fórmula.

CALMINEX® H provoca um aumento do fluxo sanguíneo na superfície do local afetado, diminuindo assim o processo doloroso (ação revulsiva). O salicilato de metila com sua ação vasodilatadora, analgésica e antiséptica, ativa a circulação, diminuindo a dor no local da lesão que prolonga-se por 6 a 12 horas. A cânfora promove um aquecimento no local afetado (ação rubefaciente).

Seu efeito terapêutico auxilia nos processos dolorosos de estruturas profundas, tipo lombalgia, torcicolo e outras mialgias.

A beladona, usada localmente, atua diminuindo a sensibilidade e aliviando a dor local. O óxido de zinco tem uma leve ação de proteção da pele.

POSOLOGIA E MODO DE USAR: Massagear levemente o local afetado com o produto durante 1 ou 2 minutos até provocar uma leve vermelhidão (hiperemia), uma a duas vezes ao dia. Conservar em temperatura entre 2°C e 30°C. O prazo de validade do produto encontra-se gravado nesta embalagem. Em caso de vencimento, inutilize o produto.

USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 2 ANOS DE IDADE

TUDO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS. Siga corretamente o modo de usar. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação médica.

ESTE MEDICAMENTO NÃO DEVE SER UTILIZADO EM CRIANÇAS MENORES DE 2 ANOS DE IDADE.

VENDA SEM PRESCRIÇÃO MÉDICA

MS 1.0093.0175.001-6 - Farm. Resp.: Alexandre de Abreu Villar - CRF - RJ 7.472

MANTECORP IND. QUÍM. E FARM. LTDA.

Est. dos Bandeirantes, 3091- Rio de Janeiro - RJ

CNPJ: 33.060.740/0001-72 - Ind. Brasileira.

® Marca Registrada

Central de Atendimento 0800 97 99 900

Calminex Hot
Adesivo térmico
AUTO AQUECE EM CONTATO COM O AR

PRINCIPAIS VANTAGENS:

Fácil de usar – É só abrir e usar.

Não precisa ser aquecido por nenhum outro meio;

Confortável e Prático – Adesivo pequeno e fino não impede suas atividades diárias (trabalhar, fazer ginástica, dançar, viajar, etc.)

Inodoro: Ninguém sabe/”sente” que você está usando!

CALMINEX® HOT é um adesivo térmico que auto aquece em contato com o ar. Alivia as dores provenientes da tensão, stress, dor nas costas, distensões e cólicas através da terapia natural do calor, que alivia a rigidez muscular e melhora a circulação sanguínea do local da aplicação.

PRECAUÇÕES: Solicite orientação médica para usar *CALMINEX HOT* caso você: Tenha problema de circulação (má circulação), diabetes, artrite ou qualquer outra condição médica séria. Apresente problemas na pele como eczemas, psoríase ou pele muito sensível. Esteja grávida.

Não é recomendado dormir com o adesivo devido à pressão exercida sobre ele quando deitado;

Remova o adesivo imediatamente caso esteja muito quente ou caso sua pele se irrite. Contate seu médico se a dor não desaparecer. **MANTENHA FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**

REAÇÕES ADVERSAS: Em raras situações podem ser observados: irritação, queimaduras ou ferimentos no local da aplicação.

ADVERTÊNCIAS: Não corte, rasgue ou danifique o adesivo. Não o utilize se o mesmo estiver rasgado ou danificado. O adesivo contém pó de ferro que pode ser nocivo se ingerido. Caso haja ingestão do produto, procure imediatamente socorro médico, levando a embalagem.

NÃO COLOQUE NO MICROONDAS OU RE-ESQUENTE O PRODUTO APÓS O USO, DESCARTE-O EM LIXO COMUM.

MODO DE USAR:

1- Abra a embalagem e retire o adesivo com cuidado;

2- Remova o papel protetor da parte adesiva;

3- Aplique o adesivo diretamente sobre a pele limpa e seca no local da dor.

Uso externo.

Após 20 min da abertura da embalagem plástica, o adesivo imediatamente começa a se aquecer mesmo sem a remoção do papel protetor da parte adesiva. Não é possível reutilizar o produto. Quando o mesmo esfriar e “empedrar”, retire com cuidado e descarte-o.

CONTRA-INDICAÇÕES: NÃO UTILIZAR O PRODUTO: Na pele irritada ou ferida, principalmente se houver ferimento aberto.

Exatamente após ter se ferido – o calor pode piorar o inchaço ou o hematoma. Evitar a aplicação de calor nas primeiras 24 horas após um trauma. No mesmo local (área) da pele por mais de 8 horas por dia. Em casos de alergia ao calor. Em crianças menores de 12 anos e idosos, a menos que o uso seja supervisionado por uma pessoa responsável. Com cremes, géis ou unguentos medicamentosos ou outro artifício que produza calor. Se o usuário for incapaz de remover o adesivo.

COMPOSIÇÃO:

GERAÇÃO DE CALOR: pó de ferro; carbono ativado; polímero de absorção de água; tripolifosfato de sódio; sulfito de sódio; solução de cloreto de sódio.

CAMADA DE VENTILAÇÃO: tecido não-texturizado de náilon repuxado; película de polietileno de ventilação.

CAMADA ADESIVA: película de polietileno de baixa densidade linear (BDL) /Película de polietileno de Metaloceno; Poliéster e Poliolefina não-texturizados; Adesivo; Película de poliéster.

EMBALAGEM EXTERNA COM VEDAÇÃO CONTRA O AR: Polipropileno; Película de poliéster revestida de alumínio; Película de polietileno; Película de metil-metacrilato de etileno.

CUIDADO DE CONSERVAÇÃO: Conservar o produto em local seco e fresco.

CENTRAL DE ATENDIMENTO

0800 97 99 900

Importado por: **MANTECORP INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA.** Estrada dos Bandeirantes, 3091- Rio de Janeiro - RJ CNPJ: 33.060.740/0001-72 - Indústria Brasileira -Fabricado por: Mycoal Co., Ltd. 388, Minakawajounai- Cho Tochigi-City, Tochigi - Pref Japão.

Registro ANVISA nº 10009300005

Farm. Resp.: Nami Lavigne Nakano CRF-RJ 8.666

® Marca Registrada.

Calminex Hot NÃO É UM MEDICAMENTO. Calminex Hot pertence à categoria produto para saúde.

Calminex Ice
Gelo* em Spray

60g/106ml 170g/300ml

Aerossol

ALÍVIO IMEDIATO DA DOR E DO INCHAÇO DE TRAUMAS E PANCADAS
PRODUTO DE TERAPIA NATURAL. NÃO É MEDICAMENTO.

A terapia natural do gelo faz com que o local da lesão tenha os vasos sanguíneos comprimidos, controlando, assim, o inchaço e aliviando a dor, especialmente nas primeiras horas após o trauma.

MODO DE USAR:

- 1 - Vaporize o jato em uma toalha/pedaço de tecido, por 2 a 3 segundos;
- 2 - Coloque a toalha na área lesionada, comprimindo levemente. Caso necessário, repita a operação em curtos intervalos.

DICA: Para prolongar o tempo de resfriamento, experimente a utilização do produto sobre o tecido úmido.

PRECAUÇÕES: Não é recomendada a aplicação do jato gelado diretamente sobre a pele.

A aplicação do produto direto e próximo da pele pode ocasionar queimaduras.

É recomendada a aplicação sobre o tecido em pessoas com até 18 anos. Caso haja a necessidade da aplicação diretamente na pele em pessoas a partir de 18 anos, aplicar o jato do aerossol a uma distância mínima de 20 cm. Evitar contato com os olhos, nariz, pele ferida e mucosas. Evitar a inalação deste produto.

MANTENHA FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

Advertências: Cuidado. Conteúdo sob pressão. O vasilhame, mesmo vazio, não deve ser perfurado. Produto inflamável.

Não use ou guarde em local quente, próximo às chamas ou exposto ao sol. Mantenha longe de inflamáveis. Nunca coloque esta embalagem no fogo ou incinerador. Proteja os olhos durante o uso.

CONTRA-INDICAÇÕES: Não deve ser utilizado em crianças pequenas (menores de 2 anos). Aplicar com muita cautela em crianças menores de 12 anos. Não deve ser aplicado em áreas com doenças malignas (câncer, neoplasia). É contra-indicado em casos de isquemia ou deficiência na circulação da área tratada ou quando há alteração da sensibilidade ou da consciência. Não deve ser utilizado nos casos de inchaços de origem não inflamatória, flebites ou hematomas frios (sem calor local).

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO: Conservar o produto em local fresco ou ventilado.

COMPOSIÇÃO: Cânfora, mentol, acetona, álcool isopropílico, normal pentano gás butano/propano.

CALMINEX ICE É O GELO EM SPRAY PARA O ALÍVIO IMEDIATO DA DOR E DO INCHAÇO DE:

ESTIRAMENTOS, CÂIMBRAS E TORCICOLOS

PROCESSOS DOLOROSOS E INFLAMATÓRIOS EM GERAL

CONTUSÕES TORÇÕES E LUXAÇÕES

TRAUMAS/PANCADAS/DORES MUSCULARES

Registro ANVISA Nº 10009300002 - Farm. Resp.: Nami Lavigne Nakano - CRF-RJ 8.666.

Licenciado por: **MANTECORP INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA.**

Estrada dos Bandeirantes, 3091 - Rio de Janeiro - RJ - CNPJ: 33.060.740/0001-72

Fabricado por: ENVASAMENTO TECNOLOGIA DE AEROSSÓIS LTDA. CNPJ: 62.970.991/0001-92

Av. Alberto Jackson Byington, 2870 - Osasco - SP

Indústria Brasileira

® Marca Registrada

Calminex Ice Bag

Contém 01 Bolsa de Gelo

Produto Descartável

PRINCIPAIS VANTAGENS

- Flexível, se molda ao local lesionado
- É prático, confortável e fácil de carregar.
- Não fica molhada.
- Não é preciso refrigerar.

CALMINEX ICE BAG é uma Bolsa de Gelo Descartável que alivia a dor e o inchaço de traumas e pancadas com extrema praticidade a qualquer hora ou lugar! É simples e fácil: Apertou, quebrou o sólido do interior da bolsa, gelou! A bolsa é ativada e sua temperatura baixa instantaneamente até -4°C mantendo-se com a temperatura baixa por até 40 minutos.

CALMINEX ICE BAG através da terapia natural do frio, comprime os vasos sanguíneos aliviando as dores e o inchaço de torções, distensões, contusões, pancadas, queimaduras leves, dor de dente, dor de cabeça simples e picadas de insetos.

MODO DE USAR:

- 1 Aperte a bolsa térmica até sentir o estouro interno.
- 2 Mexa-a de um lado para outro para misturar. Você vai sentir que a bolsa térmica se resfriará imediatamente.
- 3 Envolve-a em um tecido e aplique-a no local atingido.

APERTO, QUEBROU, GELOU!

NÃO ABRA OU RASGUE A EMBALAGEM! PRONTO PARA USAR.

CONTÉM 1 BOLSA DE GELO.

PRODUTO DESCARTÁVEL.

PRODUTO DE TERAPIA NATURAL. NÃO MEDICAMENTO.

ALÍVIO IMEDIATO DE TORÇÕES, CONTUSÕES, TRAUMAS E PANCADAS DA DOR E DO INCHAÇO

Bolsa de Gelo

Descartável

Utilize a bolsa de gelo em até 48 horas após machucar-se.

APERTO, QUEBROU, GELOU!

MANTÉM-SE GELADA POR ATÉ 40MIN

MANTENHA FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO: Conservar o produto em local seco e fresco, mantendo-o longe de fontes de calor.

USO EXTERNO. PRODUTO DESCARTÁVEL. Após o uso, descarte-a em lixo comum.

CONTRAINDICAÇÕES: Não utilizar em pessoas com deficiência sensorial.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS: Não corte, rasgue ou danifique a bolsa térmica. Não a utilize se estiver rasgada ou danificada. Não ingerir, produto nocivo. Evite o contato com o interior da bolsa, pois esta contém o nitrato de amônia, composto que irrita a pele e os olhos.

Caso ocorra ingestão ou contato acidental, procure um médico imediatamente.

Não misturar o conteúdo interior da bolsa com materiais combustíveis.

NÃO CONGELE A BOLSA TÉRMICA PARA REUTILIZÁ-LA, POIS PODE PROVOCAR QUEIMADURA NA PELE.

Recomendamos o uso da bolsa em temperaturas ambiente de até $26,6^{\circ}\text{C}$.

PRAZO DE VALIDADE: O prazo de validade de *CALMINEX ICE BAG* encontra-se impresso na embalagem.

Em caso de vencimento, inutilize o produto.

COMPOSIÇÃO: nitrato de amônia e água.

CENTRAL DE ATENDIMENTO

0800 97 99 900

Registro ANVISA nº 10009300003

Farm. Resp.: Nami Lavigne Nakano CRF-RJ 8.666

Importado por:

MANTECORP INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S.A.

Estrada dos Bandeirantes, 3091- Rio de Janeiro - RJ

CNPJ: 33.060.740/0001-72 - Indústria Brasileira

Fabricado por: Shanghai Intco Medical Supply Co., Ltd.

No 1299 Hubin Rd Fengxian District, Shanghai China

® Marca Registrada.

Calminex Ice Bag NÃO É UM MEDICAMENTO. Calminex Ice Bag pertence à categoria produto para saúde.